



Onderstaande pagina's geven u een indruk van de inhoud van het door u gedownloade boek.

Voor de volledige tekst kunt u het boek online bestellen via [www.uitgeverijcyron.nl](http://www.uitgeverijcyron.nl)

**De Homoeopathische Behandeling  
van Kanker**

*Materia Medica*  
*Repertorium*  
*Verzamelde Artikelen*  
*Casuïstiek*  
*Commentaren*

R.H. van der Zee

CYRON

## DE HOMOEOPATHISCHE BENADERING VAN KANKER

C.M. Boger

Studies in the Filosofie of Healing - pag. 90, 91, 92

Samen met andere homoeopaten heb ik enkele wonderbaarlijke genezingen van kanker gezien na toediening van een homoeopathisch geneesmiddel. Bijna elk geneesmiddel kan deze ziekte genezen; de keuze dient dan gebaseerd te zijn op enkele specifieke of prominente indicaties, maar het geneesmiddel moet daarbij ook de generale symptomen hebben die corresponderen met de levensgeschiedenis van de patiënt. Het moet daarom exact en geheel corresponderen met het ziektebeeld. Omdat dit over het algemeen niet gebeurt, is het begrijpelijk dat genezing uitblijft.

Boenninghausen benadrukt in zijn *Aphorisms of Hippocrates*, 5-54, pag. 327, de correcte methode; hij zegt daar krachtig en duidelijk:

“Zwelling en induratie van de baarmoedermond is altijd een gevaarlijk gegeven en kan gemakkelijk leiden tot baarmoederkanker. Alleen in de beginfase - door het accuraat kiezen van een generaal symptoomcomplex (dus niet lokaal), samen met voldoende concomiterende symptomen waarop uiteindelijk de keuze van het geneesmiddel gebaseerd dient te worden - kan een complete genezing tot de mogelijkheden behoren. Van begin af aan is er een ernstige noodzaak om met de grootste zorgvuldigheid en voorzichtigheid een meest passend middel te kiezen uit de hierna volgende aanbevolen reeks, waarmee mijn collega's en ikzelf altijd succes hebben gehad bij de behandeling van dit kwaad, nog voordat het een ongeneeslijk stadium had bereikt. Deze geneesmiddelen zijn: *Ars.*, *Aur.*, *Bell.*, *Carb-an.*, *Chin.*, *Clem.*, *Ferr.*, *Kreos.*, *Lach.*, *Mag-m.*, *Merc.*, *Plat.*, *Puls.*, *Sabin.*, *Sars.*, *Sec.*, *Sep.*, *Thuj.*”

Mijn eigen ervaringen zijn de volgende. Een vrouw van middelbare leeftijd die frequent leed aan aften, ontwikkelde een gerafelde, serpigineuze, snel groeiende zweer op de binnenzijde van haar onderlip, die bijna door de huid penetreerde. De zweer was zo groot als een cent en had een diepe fissuur die omlaag naar de kin liep en er waren reeds meerdere zweren ontstaan op het zachte gehemelte. Ze had zwervende, schietende pijnen door het hele lichaam die uiteindelijk een zeer gevoel bewerkstelligden. Melk drinken gaf een zure smaak; ze was traag, dik en niet erg proper (schoon). Een enkele dosis *Kalium bichromicum* MM, na zes dagen herhaald, bewerkstelligde een complete genezing.

Radicale genezingen na herhaaldelijke operaties zijn maar heel weinig voorgekomen, maar als *Nitricum acidum* voorgeschreven wordt op de gebruikelijke indicaties, zal het veelvuldig genezend werken, ditzelfde geldt voor *Silicea*. Als er in de borsten - ondanks eerdere operaties - opnieuw knobbelvorming ontstaat, werkt *Bellis perennis* vaak genezend. Zoals we weten zijn dit angstige tijden voor de patiënte, en ze wacht het resultaat van ons voorschrijven dan ook in grote onrust af. Bij de toxische crisis die zo vaak de inleiding is voor erysipelas, is *Bellis perennis* mijn steun en toeverlaat. Het geneest niet werkelijk, maar het reduceert de tendens tot bloedingen bijna tot het nulpunt, het werkt enigszins op de toxische aanval en verlengt de klachtenvrije periode die tussen de aanvallen in optreedt in grote mate. *Bellis* werkt voor mijn gevoel sterker en dieper dan *Arnica* - de rest van het geneesmiddelbeeld zal u bekend zijn. De belangrijkste geneesmiddelen die palliatief werken bij ongeneeslijke gevallen zijn voor mij: *Calcium carbonicum* voor klachten die gelijken op kraambeen-achtige problemen; *Tellurium* voor de afschuwelijke stank en voor *purpurea figurata* (wat soms aanwezig is); en vooral *Opium* in een zeer hoge potentie als de patiënt voortijdig een oud, bruin en wegwijnend uiterlijk krijgt; *Sabal serrulata* onderdrukt de stekende pijnen van kanker van de urinewegen en verlengt het leven, zelfs zo sterk dat het lijkt alsof er van genezing sprake is.

## LEVERKANKER

Zowel Lilienthal als Raue geven voor deze vorm van kanker geen indicaties. Raue zegt: "Ikzelf ken geen geval dat genezen is. De beste geneesmiddelen die verlichting zouden kunnen geven zijn: *Ars.*, *Bell.*, *Carb-an.*, *Con.*, *Hydr.*, *Lyc.*, *Sep.*, *Sil.*, en andere middelen al naar gelang hun karakteristieke indicaties."

Kamthan geeft de volgende indicaties:

**Cholesterinum [D3, 4 maal]:** Een groot geneesmiddel bij leverkanker; de lever is vergroot en verhard, pulsaties in de maagstreek, induraties; als de pijn hevig is, houdt de patiënt tijdens het lopen zijn hand op de zij.

**Chionanthus [ø]:** Als de lever verhard en vergroot is, geelzucht, frequent urineren, strak gevoel om en nabij de darmen, constipatie, kleikleurige ontlasting, dreigende maligne toestand, gele, jeukende huid, soms is de milt vergroot.

**Carduus marianus [ø - 20 tot 30 druppels, 4 maal]:** Vergrote en verharde lever, dreigend oedeem of kanker, constipatie, met een harde, knoperige, kleikleurige ontlasting, of diarree. Linker leverkwab is gevoelig, misselijkheid en overgeven, gezwollen, harde of pijnlijke galblaas, steken, in de linkerzijde van de maag. Het is een tussenwerkend middel (andere middelen kunnen van indicatie zijn). Het is een specifiek geneesmiddel aan het begin van de ziekte, alsmede bij de chronische vorm.

Opmerking: **Myrica [ø-D3]** en **Chelidonium [D3]** kunnen ook in overweging worden genomen (herhaaldelijke doses); de huid, de ogen en de urine zijn geel verkleurd.

**China [C6]:** Flatulentie, < na het eten, oprispingen zonder >, > lopen. Vergrote en verharde lever, zo ook de galblaas, inwendige koude (van de maag), met gevoeligheid voor aanraking en voor tocht, verlies van lichaamsvloeistoffen, > voorover buigen of harde druk, < aanraking.

**Kalium carbonicum:** Vergrote en verharde lever, stekende pijn, gevoelig voor koude, < liggen op de linker of pijnlijke zij, vaak < na 02.00u.

**Lachesis:** Als de lever gevoelig is voor aanraking en druk en andere symptomen < na het slapen zal Lachesis C200 in drie doses goed werken.

**Lycopodium:** De symptomen < tussen 16.00 en 20.00u.

**Ptelea [C30]:** Gevoel van een gewicht en pijn in de rechterzij, zeer gevoel in de lever, de lever is gezwollen en gevoelig voor druk, droge mond, hitte en branden, soms treden maag- en leverklachten gelijktijdig op, oprispingen, > liggen op de

rechterzij. Pré-cancereus stadium.

### Overige indicaties

1. Als de lever hard en gezwollen is, met bonzen in het epigastrium, enorme eetlust en dorst, lege oprispingen, voedsel veroorzaakt gasvorming, < als men niet eet, dan is **Iodium** het aangewezen middel.
2. Pijn > liggen op de pijnlijke zij: *Bry., Ptel.*  
Pijn < liggen op de linkerzij: *Bry., Nat-s., Ptel., Benz-ac., Phos., Thuj., Sulph.*  
Pijn < liggen op de rechterzij: *Chel., Kali-c., Mag-m., Merc.*  
Pijn > wrijven en `schudden': *Podo.*
3. Stekende pijn in de lever: *Berb., Bry., Carb-v., Chel., Chin., Dios., Hep., Kali-c., Merc., Nat-s., Nit-ac., Nux-v., Sulph.*
4. Verharde lever: *Chin., Con., Fl-ac., Graph., Iod., Lyc., Mag-m., Merc., Nux-v., Tarax.*
5. Lever gevoelig voor druk een aanraking: *Aesc., Aloe., Bell., Berb., Card-m., Chel., Chin., Fl-ac., Graph., Hydr., Iod., Kali-c., Lach., Lyc., Mag-m., Merc., Nux-v., Phos., Podo., Ptel., Sep., Tarax.*
6. Soms zal **Carcinosinum C6** in afwisseling met andere van indicatie zijnde middelen de patiënt veel goed doen.
7. **Carcinosinum 1000**, eenmaal per week is ook bruikbaar.
8. **Hydrastis C6** afgewisseld met **Carcinosinum C6** werken goed.
9. **Hydrastis** ø, 20 druppels wordt gebruikt voor men gaat slapen, dit verwijderd de hardnekkige constipatie.
10. **Hydrastis** ø, 20 druppels 3 maal daags, bestrijdt samen met andere middelen kanker.
11. Als de tong flink beslagen is, er geen eetlust is, de ontlasting geel en papachtig is, we geelzucht zien, de urine donker gekleurd is en suiker bevat, is **Chionanthus** het aangewezen middel.

### *Pijn in de lever:*

**Aesculus** - Doffe, zeurende pijn in de lever, met aambeien.

**Arsenicum album** - Bruikbaar bij hopeloze gevallen met de indicaties: extreme uitputting, slapeloosheid, hevige en frequente dorst, maar drinkt telkens kleine beetjes, angst voor de dood, > warmte.

**Bryonia** - Brandende, stekende pijn (Berb.), < hoesten en beweging; steken in de lever met constipatie, harde ontlasting; rechtszijdige pijn, > liggen op de rechterzij (Ptel.).

**Carduus marianus** - Pijn, met een zeer gevoel en geelzucht, kleikleurige ontlasting.

**Ceanothus [C6-C30]** - Pijn in de lever en rug, met een vergrote milt.

**Chelidonium** - Galkoliek met geelzucht.

**China [C6]** - Galsteenkoliek (Berb.).

**Dioscorea** - Radiërende pijn, > rondlopen.

**Jatropha** - Pijn in de lever en onder het rechter schouderblad.

**Juglans cinerea** - Pijn in de lever en het rechter schouderblad met geelzucht.

**Kreosotum** - Overgeven enige tijd na de maaltijd, stinkend overgeefsel met bloed, brandende pijn.

**Leptandra** - Pijn in de lever, uitstrekkend naar de wervelkolom met zwarte ontlasting.

**Mercurius solubilis [C6-C30]** - Aften, speekselvloed, zeer gevoel in de lever bij aanraking, geelzucht, induratie, groene ontlasting, stekende pijn, < 's nachts.

**Myrica** - Doffe pijn in de leverstreek met geelzucht en verlies van eetlust.

**Nitricum acidum** - Verharde lever, snijdende pijn, verzwakte constitutie, bloedende fissuren, stinkende ontlasting, geelzucht, gevoelig voor druk en aanraking, < kou.

**Nux vomica** - Steken in de lever met oprispingen en een frequente aandrang tot stoelgang, < ochtend.

**Podophyllum** - Pijn > door liggen op de maag en wrijven van het aangedane deel.

**Ptelea** - Rechtszijdige pijn, > liggen op de rechterzij (Bry.).